


	毒の名前	致死量LD50(μg/kg)	由来
1	ボツリヌストキシン	0.00003	微生物
2	破傷風トキシン	0.002	微生物
3	リシン	0.1	植物(トウゴマ)
4	パリトキシン	0.5	微生物
5	バトラコトキシン	2	動物(ヤドクガエル)
6	テトロドトキシン(TTX)	10	動物(フグ)／微生物
7	VX	15	化学合成
8	ダイオキシン	22	化学合成
9	d-ツボクラリン	30	植物(クラーレ)
10	ウミヘビ毒	100	動物(ウミヘビ)
11	アコニチン	120	植物(トリカブト)
12	アマニチン	400	微生物(キノコ)
13	サリン	420	化学合成
14	コブラ毒	500	動物(コブラ)
15	フィゾスチグミン	640	植物(カラバル豆)
16	ストリキニーネ	960	植物(馬銭子)
17	ヒ素	1,430	鉱物
18	ニコチン	7,000	植物(タバコ)
19	青酸カリウム	10,000	化学合成(KCN)
20	ショウコウ	0.2~0.41(LD ₀)	鉱物(HgCl ₂)
21	酢酸タリウム	32(LD ₀)	鉱物(CH ₃ CO ₂ Tl)

トキシン: 生物由来の毒

呼吸毒

酸素の代わりに
一酸化炭素、硫化水素、
シアン化水素がヘモグロ
ビンの鉄と結合して離れない



神経毒

・神経細胞内伝達阻害

アコニチン ← 拮抗性
テトロドトキシン ← 拮抗性

・神経細胞間伝達阻害

サリン ← 拮抗性
アトロピン ← 拮抗性