ブートストラップ法 シミュレーション

60歳未満と60歳以上に5段階レベルのアンケート調査した結果です。

=RAND()で乱数発生

=RANK(乱数赤枠,2)を用い
乱数の大小関係の順番を求める

No.	元データ	適用
1	5	60歳未満
2	3	
3	4	
4	5	
5	4	
6	2	60歳以上
7	1	
8	3	
9	1	
10	2	
11	4	

乱数	No.	並べ替え
0.864991	10	2
0.963819	11	4
0.488386	7	1
0.650169	8	3
0.733874	9	1
0.481577	5	4
0.160006	2	3
0.139959	1	5
0.308537	4	5
0.482459	6	2
0.179204	3	4

=VLOOKUP(No,緑枠,2)を用い
No.に対応するデータを並べ替える

	60歳未満	60歳以上	差の絶対値	p値
0	4.2	2.2	2	
1	3.6	2.7	0.9	0.021
2	4	2.3	1.7	0.02
3	4	2.3	1.7	0.017
4	3.2	3	0.2	0.018
5	4	2.3	1.7	0.028
6	3.4	2.8	0.6	0.023
7	3.6	2.7	0.8	0.021
8	3.4	2.8	0.6	0.017
9	3.6	2.7	0.9	0.023
10	2.8	3.3	0.5	0.012

p値が0.05より小さいことより、シミュレーションによりアンケートの解析結果の信頼性があることを示している